

HIVATALOS VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS

2026/I.

AZ AMERIKAI SZŐLŐKABÓCA ELLENI ROVARÖLŐ SZERES VÉDEKEZÉSEK ELVÉGZÉSE MINDEN TERMELŐ SZÁMÁRA KÖTELEZŐ!

1. INDOKLÁS

Az amerikai szőlőkabóca terjeszti a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó (FD) fitoplazmát, mely betegség gyógyíthatatlan. Az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés célja a járvány megfékezése. A kártevő lárváinak kelése Zala vármegyében 2026. május közepétől megkezdődött és több hétig tart. A kikelt lárvák kezdetben még nem fertőző képesek, azonban az FD fertőzött tőkék szívogatását követő egy hónap múlva már képesek az FD-t terjeszteni. Bővebb információ az FD-ről és az amerikai szőlőkabócáról az alábbi linken érhető el: <https://portal.nebih.gov.hu/fd-betegseg>

2. JOGSZABÁLYI ALAP ÉS SZANKCIÓK

Az (EU) 2016/2031 rendelet, a 2008. évi XLVI. törvény és a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet jogszabályi előírásaival összhangban az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés kötelező. A kezeléseket a közzétett védekezési felhívásokban meghatározott időzítés figyelembevételével szükséges elvégezni. A mulasztás növényvédelmi bírságot, a támogatások megvonását vagy az ültetvény kivágását vonhatja maga után.

3. HATÁRIDŐK ÉS ÜTEMEZÉS

Stádium	Optimális időpont	Művelet
L2-L3 fejlettségű lárva	2026. június 15-25. között	Permetezés
L3-L5 fejlettségű lárva	az első kezelés után 2-3 hét múlva, max. 2026. július 10-ig	Permetezés
Kifejlett alak (Imágó)	Előrejelzési adatok, sárga ragacslapos megfigyelés szerint a szüreti és azt megelőző élelmezés-egészségügyi várakozási időszak kivételével szükség esetén szeptember végéig	Permetezés

4. ENGEDÉLYEZETT SZEREK

Részletes rovarölő szer lista mellékelve, illetve a NÉBIH honlapján vagy az alábbi linken:
<https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1504431079/Engedelyezett+rovarolo+szerek.pdf>

5. HASZNOS TUDNIVALÓK A HATÉKONYSÁGÉRT

- Törzstisztítás: A permetezés előtt feltétlenül végezze el a törzstisztítást, mert a lárvák elsősorban a tőhajtásokon bújnak meg.
- Permetlé fedettsége: Ügyeljen a teljes lombfelület és a levelek fonákának megfelelő permetborítására.
- Szerfelhasználás: Javasolt legalább **több alkalommal felszívódó készítményt alkalmazni** a tartós hatás érdekében. **Fontos a terület egységre szükséges rovarölő szer kijuttatása!**
- Bővebb információ és technológiai segédlet:

KÉMIAI ROVARÖLŐ SZERES VÉDEKEZÉS
[Amerikai szőlőkabóca - Integrált növényvédelmi technológia összefoglalása](#)

ÖKOLÓGIAI MŰVELÉS SZERINTI VÉDEKEZÉS
Az aranyszínű sárgaság és az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ajánlott technológiája ökológiai művelésben - Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet

6. HATÓSÁGI SZEMÉLYEK ÉS HEGYBÍRÓ ELÉRHETŐSÉGE

Bővebb információért forduljon bizalommal a [növényvédelmi hatósághoz](#) (Telefon: 92/ 550-160, E-mail: noveny.talajvedelem@zala.gov.hu) és a hegybíróhoz (83/362-089).

2026. június 04.

Zala Vármegyei Kormányhivatal
AF Növény- és Talajvédelmi Osztály

A Zala Vármegyei Kormányhivatal, mint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró szerv (továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) a **szőlő arany színű sárgaság fitoplazma** (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) zárlati károsítót terjesztő **amerikai szőlőkabóca** ellen **2026. évre vonatkozó első védekezési felhívást** teszi közzé Zala vármegye összes szőlő területére.

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS I.

Az **amerikai szőlőkabóca** (*Scaphoideus titanus*) egy idegenhonos rovarkártevő melynek közvetett kártétele jelent fenyegetést a hazai szőlőtermesztésre, mivel a **zárlati státuszú szőlő arany színű sárgaság betegséget okozó fitoplazmát terjeszti**. A fitoplazma járványszerű terjedése jelentős gazdasági károkat idéz elő a szőlőültetvényekben. Jelenlegi ismereteink szerint a **zárlati fitoplazma által okozott betegség nem gyógyítható, a védekezés egyetlen hatásos módja a megelőzés**. Amennyiben felmerül a betegség gyanúja, azt azonnal jelenteni kell az illetékes hatóságoknak.

A **megelőzéshez**, a fertőzés visszaszorításához **szükséges a kórokozót terjesztő amerikai szőlőkabóca elleni hatékony védekezés**, valamint a fertőzésmentes szőlő-szaporítóanyag előállítása. Fontos a tél végi nyesedékek eltávolítása, valamint megsemmisítése, hiszen a kabóca tojás alakban telel át az idősebb szőlővessző foszló kérge alatt.

Az áttelelt tojásokból az amerikai szőlőkabóca lárvák kelése – időjárástól és az ültetvény fekvésétől függően – május közepétől július első dekádjáig tart.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által a megye szőlőültetvényeiben elvégzett felmérések szerint az amerikai szőlőkabóca lárvakelése - ami hetekig elhúzódó folyamat - 2026. évben május 20. után kezdődött meg.

Zala vármegye szinte valamennyi települése, szőlő területe zárlati intézkedéssel érintett ezért az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv növényegészségügyi zárlatot elrendelő határozatai alapján - **kötelező az amerikai kabóca ellen évente minimum 3 alkalommal** (első két alkalommal a lárvák, harmadik alkalommal a kifejlett egyedek ellen) **történő rovarölő szeres védekezés**, melyet a védekezés optimális idejére vonatkozó hirdetményi úton közzétett védekezési felhívások figyelembevételével kell végrehajtani.

A lárvák elleni **első kezelés optimális ideje az az L3-as lárvastádium előfordulásának időszaka, június 15-25. közötti időszak (a szőlő virágzása alatt, vagy a virágzás után)**. A védekezés pontosabb időzítéséhez segítséget nyújt az interneten bárki számára hozzáférhető, NÉBIH által üzemeltetett károsító-monitoring rendszer <https://karositomonitoring.nebih.gov.hu/Terkepek/AmerikaiSzolokabocaMap>.

A második kezelést, ez első kezelés után **2-3 hét múlva, legkésőbb július 10. napjáig kell elvégezni**. A szőlő és a rajta élő kabóca fejlődése évjáratonként változó, ezért a védekezések pontosabb időzítéséhez segítséget nyújt a NÉBIH által üzemeltetett károsító-monitoring rendszer.

A NÉBIH honlapon az amerikai szőlőkabócáról szóló tájékoztatás Észlelések menüpontja alatt növényorvos szakemberek által feltöltött adatok találhatóak a kabóca egyes lárvastádiumainak megjelenéséről Zala megyében végzett megfigyelések alapján.

A védekezésre a felhívás mellékletének táblázatában szereplő rovarölő szerek alkalmazhatók.

A hatékony védekezés feltétele, hogy a kötelező kezelések előtt a szőlőnövényeken a törzstisztítás elvégzésre kerüljön, vagy amennyiben nem történik meg, a kezelések a tőhajtásokat is érik. Továbbá a védekezés hatékonyságát növeli, ha **a lárvák elleni védekezés során legalább egyszer felszívódó növényvédő szer** kerül felhasználásra. A kontakt növényvédő szerek esetében a teljes lombfalon **a levelek mindkét oldalának a fedettsége szükséges**, mivel a lárvák általában a levél fonáki részen tartózkodnak. **Figyelemmel kell lenni a rezisztencia kialakulásának megelőzésére**, ezért a növényvédő szerek okirataiban meghatározott kezelések évenkénti maximális számának betartása fontos. A készítmény túlzott felhígulása hatáscsökkenéshez vezethet, ennek elkerülése érdekében **a kijuttatandó permetlé mennyiségét a szőlő ültetvény területének és lombzatának méretéhez szükséges igazítani**. A júniusi kisebb lombzatú szőlő permetezéséhez kevesebb víz elég, mint a nyár végi nagyobb lombzatú szőlő esetében. A permetezések során egyes szőlőfajták **virágzásakor**, illetve, ha a sorközökben virágzó gyomok vannak, az alkalmazott rovarölő szer **méhveszélyességét figyelembe kell venni**. A növényvédő szerek kijuttatása során – adott esetben – figyelmet kell fordítani a gyártó ajánlása szerint a **permetlé pH-jának beállítására**, valamint **egyres piretroid típusú növényvédő szerek UV érzékenysége** miatt a kijuttatás napszakának a megválasztására.

Az ökológiai szőlőültetvények esetében az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet által elkészített védekezési technológia (<https://biokutatas.hu/hir/az-amerikai-szokaboca-elleni-okologiai-vedekezes-2/>) érhető el.

A konvencionális szőlőültetvények esetében a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara által elkészített védekezési technológiai (https://magyarnovenyorvos.hu/upload/images/ST-Larva%20technologia%20HÁZIKERTI.pdf) érhető el.

AKG és ÖKO támogatásokhoz kapcsolódó kötelezettség

A szőlő aranyszínű sárgaság terjedésének megakadályozása érdekében:

- a KAP-RD19a-1-24 kódszámú „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések” (AKG),
- valamint a KAP-RD20a-1-24 kódszámú „Ökológiai gazdálkodás támogatása” (ÖKO)

pályázati felhívások keretében támogatott szőlőültetvényekben évente legalább két alkalommal kötelező növényvédőszeres védekezést végezni az amerikai szőlőkabóca ellen.

A szaporítóanyag-előállító területeken (törzsültetvények, faiskolák) a vektor elleni **védekezés kötelező**, függetlenül attól, hogy előfordul-e kabóca a területen vagy sem.

A kifejlett egyedek elleni harmadik kezelésre újabb védekezési felhívás kerül kiadásra a kabóca csapdák fogási eredményei alapján.

Zalaegerszeg, 2026. június 04.

A főispán helyett eljáró Dr. Varga Andrea nevében és megbízásából

Szabó Béla
osztályvezető

Szőlőben kabócafajok ellen engedélyezett rovarölő szerek – 2026.

(Forrás: Növényvédő szerek adatbázisa, NÉBIH. Lezárva: 2026. április 22.)

Készítmény	Hatóanyag	Forgalmi kategória	Kiszerezés	A legkisebb kiszerezéssel lekezelhető terület	A kezelések max. száma / év	Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre	Hatás-mechanizmus	Méh-veszélyesség
Decis	deltametrin	III.	5×3 ml 50 ml	5×200 m ² 3333 m ²	2	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Decis Forte Detector, Nuyard	deltametrin	I. II.	≥100 ml 50 ml	1,3 ha 6.666 m ²	2	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Decis Mega	deltametrin	II.	≥100 ml	666 m ²	3	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Karate Zeon 5 CS Full 5 CS, Kendo 5 CS, Ninja Zeon 5 CS, Karate Zeon, Karate Zeon 050 CS	lambda-cihalotrin	II. III.	≥200 ml 2,5; 5; 50 ml	8000 m ² 2,5 ml-100 m ²	2	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Klartan 24 EW Mavrik 24 EW, Monospel 24 EW	tau-fluvalinát	I. II.	0,2 l 3 ml	6.666 m ² 100 m ²	2	lárva, imágó	kontakt	nem veszélyes virágzásban nappal kijuttatható
Lamdex Extra (származtatott: Axiendo 2,5 WG, La-Cy Extra	lambda-cihalotrin	III.	5; 50; 200 g; 1 kg; 5 kg	100 m ²	2	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Mospilan 20 SG Gazelle 20 SG, Mospilan 20 SG Original, Rafing, Spilan 20 SG; Mospilan SG *	acetamiprid	I. II. III.	≥1 kg 100 g 4 g	2,6 ha 2.666 m ² 106 m ²	1 <i>csak szőlő alanytelepen használhatók</i>	lárva	szisztémikus	<i>csak szőlő alanytelepen használhatók</i>
Carnadine Roslix, Silentium; Carnadine, Carnadine 200, Roslix	acetamiprid	I. II.	≥150 ml ≥2 ml	8.571 m ² 114 m ²	1 2026.04.21.- 2026.08.18.	lárva	szisztémikus	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Exirel , Irazu	ciántranilipropir 1	I. II.	≥200 ml ≥20 ml	2.222 m ² 220 m ²	2	lárva	szisztémikus	veszélyes virágzásban nem

Sanium System Deltam System	flupiradifuro n	II. III.	>500 ml ≤500 ml (4; 5; 6; 8; 10; 12; 50; 75; 100; 125; 250; 300; 500 ml)	0,4 % (10 l vízhez 40 ml)	1	lárva, imágó	szisztemikus	nem veszélyes virágzásban nappal kijuttatható
Sivanto Prime Sivanto Prime 200 S	flupiradifuro n	I. II.	200 l 50 ml	400- 500 ha 1000-1250 m ²	1	lárva, imágó	szisztemikus	nem veszélyes virágzásban nappal kijuttatható
Sivanto Energy Sivanto Energy 85 E	deltametrin+ flupiradifuro n	I.	≥250 ml	6.250 m²	2	lárva, imágó	kontakt és szisztemikus	veszélyes virágzásban nem kijuttatható
Sumi Alfa 5 EC	eszfenvalerát	I.	≥0,25 l	8.333 m²	2	lárva, imágó	kontakt	mérsékeltlen veszélyes esti permetezés
Sumi Alfa 5 EW Sumicidin 5 EW	eszfenvalerát	I.	≥5 ml	166 m²	2	lárva, imágó	kontakt	mérsékeltlen veszélyes esti permetezés
Pyregard ökológiai termesztésben is felhasználható	piretrin	I.	1 l	1,3 ha	2 2026.03.16.- 2026.07.13.	lárva, imágó	kontakt	veszélyes virágzásban nem kijuttatható
Laser, Nexsuba ökológiai termesztésben is felhasználható	spinozad	II.	≥500 ml	1,25 ha	2	lárva	kontakt	mérsékeltlen veszélyes esti permetezés
Laser Duplo ökológiai termesztésben is felhasználható	spinozad	II. III.	≥250 ml 2; 4; 5; 10; 20; 40; 100 ml	1,25 ha 2 ml-100 m²	2	lárva	kontakt	mérsékeltlen veszélyes esti permetezés
Limocide ökológiai termesztésben is felhasználható	narancsolaj	II.	1 l	1 ha	6	lárva, imágó	kontakt	veszélyes virágzásban nem kijuttatható
Aza ökológiai termesztésben is felhasználható	azadirachtin A	II.	≥150 ml	500 m²	2 2026.05.11.- 2026.09.07.	lárva, imágó	nem ismert	nem veszélyes virágzásban nappal kijuttatható
NeemAzal-T/S ökológiai termesztésben is felhasználható	azadirachtin A	II. III.	≥2,5 l 25; 50; 100 ml; 1 l	8.333 m² 25 ml-83 m²	2 2026. 05.11.- 2026.09.07.	lárva, imágó	nem ismert	nem veszélyes virágzásban nappal kijuttatható

Megjegyzés: a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat előírásai szerint történjen.